



تولیدات دامی

دوره ۲۳ ■ شماره ۱ ■ بهار ۱۴۰۰

صفحه‌های ۱۳-۲۰

DOI: 10.22059/jap.2020.300415.623522

مقاله پژوهشی

گوارش‌پذیری مواد مغذی، عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بردهای پرواری زندی تغذیه‌شده با سطوح مختلف کنجاله سیاه‌دانه

بهنام روشانی^۱، محمدعلی نوروزیان^{۲*}، احمد افضلزاده^۳

۱. دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

۲. دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

۳. استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

چکیده

بهمنظور بررسی تأثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سیاه‌دانه بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه، از تعداد ۱۸ راس بره نر زندی (با میانگین وزن 29.5 ± 1.5 کیلوگرم و سن 7 ± 1 روز) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و به مدت ۹۰ روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل (۱) جیره شاهد حاوی نه درصد کنجاله کلزا، (۲) جیره حاوی ۴/۵ درصد کنجاله کلزا و (۳) جیره حاوی نه درصد کنجاله سیاه‌دانه بود. مقدار ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، NDF و ADIN کنجاله سیاه‌دانه به ترتیب 92.60 ± 0.58 ، 7.24 ± 0.27 ، 9.26 ± 0.58 ، 12.0 ± 3.1 و 35.8 ± 1.0 و 24.1 ± 1.5 درصد بود. تفاوتی از نظر گوارش‌پذیری ماده آئی، NDF، چربی و پروتئین خام جیره‌ها مشاهده نشد. تأثیر جیره‌های آزمایشی بر مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی، بازده لاشه، وزن کبد، قلب، طحال، کلیه و بیضه معنی دار نبود. اما وزن نسبی دنبه، چربی زیرجلدی و چربی کل لاشه با جایگزینی کنجاله سیاه‌دانه به جای کنجاله کلزا کاهش یافت ($P < 0.05$). به جز آلبومین و پروتئین کل که در بردهای تغذیه‌شده با جیره حاوی نه درصد کنجاله سیاه‌دانه افزایش داشت ($P < 0.05$)، سایر فراسنجه‌های خونی (گلورک، نیتروژن اورهای خون، تری‌گلیسرید و کلسترول) در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشتند. براساس نتایج این مطالعه و با توجه به کمود منابع پروتئینی در تغذیه دام می‌توان تا سطح نه درصد جیره از کنجاله سیاه‌دانه در جیره بردهای پرواری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: بره زندی، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم، کنجاله سیاه‌دانه.

Nutrient digestibility, performance, carcass characteristics and blood parameters of fattening Zandi lambs fed by different levels of black seed (*Nigella sativa*) meal

Behnam Roshani¹, Mohammad Ali Norouzian^{2*}, Ahmad Afzalzadeh³

1. Former M.Sc. Student, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

2. Associate Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

3. Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

Received: April 5, 2020

Accepted: October 14, 2020

Abstract

To study the effects of replacing canola meal with black seed meal on performance, blood parameters and carcass characteristics, eighteen male lambs (with initial BW, 29.5 ± 1.5 kg and 110 ± 7 days of age) were used in a completely randomized design with 3 different treatments over 90 days. Experimental treatments were: 1) control; diet containing 9% canola meal, 2) diet containing 4.5 % canola meal plus 4.5 % black seed meal and 3) diet containing 9 % black seed meal. The amount of dry matter, ash, crude protein, fat, NDF, ADF, and ADIN of black seed meal was 92.60 ± 0.58 , 7.24 ± 0.27 , 35.8 ± 1.0 , 12.31 ± 0.51 , 24.56 ± 1.24 , 13.0 ± 0.79 and 2.15 ± 0.17 , respectively. There were no significant differences between treatments for digestibility of organic matter, NDF, fat and protein. Daily feed intake, feed conversion ratio, daily weight gain, final body weight, carcass efficiency, weight of liver, heart, kidney and testis were not differed between experimental groups. However, lambs fed with black seed meal had lower level of subcutaneous fat, tail-fat and total body fat deposition compared to control group ($P < 0.05$). Feeding 9% black seed meal increased blood total protein and albumin concentration compared to the other experimental groups ($P < 0.05$). The results of this study showed that it could be feasible to use black seed meal up to 9% in finishing lamb diet.

Keywords: Black seed meal, Blood metabolites, Digestibility, Performance, Zandi lamb.

دارای نه اسید آمینه ضروری است و در مقایسه با کنجاله سویا به جز لایزین برتری دارد. همچنین چربی موجود در آن بیش از ۵۰ درصد اسیدلینولیک دارد [۱۱]. استفاده از سیاهدانه به عنوان آنتیکسیدان طبیعی، سبب بهبود فرستندهای بیوشیمیایی خون بز [۱۴]، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی خون [۱۰] و کاهش استرس اکسیداتیو [۳] گوسفند شده است. همچنین افزودن سیاهدانه به جیره بلدرچین و خرگوش سبب بهبود عملکرد رشد شده است [۶ و ۱۷]. مطالعات کمی در مورد استفاده از کنجاله سیاهدانه در تغذیه دام و طیور کشور وجود دارد. گزارش شده است که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاهدانه در جیره جوجه گوشتی تا سطح ۵۰ درصد، تأثیر منفی بر عملکرد نداشته است [۲].

آمار دقیق در مورد سطح زیر کشت سیاهدانه و میزان تولید کنجاله آن در کشور وجود ندارد، اما با توجه به این که این کنجاله به روش فرایند سرد و به طور عمده در کارگاههای کوچک به دست می‌آید که در آن راندمان استخراج روغن پایین است، علاوه بر میزان پروتئین بالا، محتوای روغن (انرژی) آن نیز قابل توجه است. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به فراهمی پروتئین و انرژی در این کنجاله و نیز قیمت کمتر آن نسبت به کنجاله سویا و کلزا، استفاده از آن در تغذیه نشخوارکنندگان اقتصادی باشد. در عین حال اطلاعات تغذیه‌ای کمی درباره ارزش غذایی آن بهویژه در جیره بردهای پرواری وجود دارد. هدف از این آزمایش بررسی تأثیر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سیاهدانه بر عملکرد، فرستندهای خون و صفات لاشه بردهای پرواری زندی بود.

۲. مواد و روش‌ها

در ابتدای آزمایش، کنجاله سیاهدانه به مقدار لازم از کارخانه روغن‌کشی تهیه شد که در آن روغن‌کشی به روش

۱. مقدمه

کمبود مواد خوراکی مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت دامپروری است. لذا بهبود کیفیت منابع موجود و شناسایی و تعیین ارزش غذایی منابع جدید مواد خوراکی از مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی مراکز پژوهشی بهشمار می‌رود. در این بین، منابع پروتئین بهدلیل کمبود عرضه، قیمت بالا و در عین حال ارزش غذایی پیش‌تر بهویژه در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. امروزه مهم‌ترین منابع پروتئین موردادستفاده در تغذیه دام، کنجاله دانه‌های روغنی هستند که بهدلیل مقدار پروتئین بالا و کیفیت مناسب آن، ارزش غذایی بالایی در تغذیه دام و طیور دارند. منابع پروتئین معمول موردادستفاده پیش‌تر شامل کنجاله‌های سویا، کلزا و پنبه‌دانه هستند، اما کمبود عرضه و قیمت بالای آنها سبب شده است تا پژوهش‌گران و پرورش‌دهندگان دام و طیور به دنبال یافتن منابع جدید جهت جایگزینی بخشی از پروتئین موردنیاز جیره باشند. یکی از منابع پروتئین ناشناخته اما با ارزش در تغذیه دام و *Nigella sativa* گیاهی یکساله و گل دار از خانواده آلاله است که استفاده دارویی از آن پیشینه تاریخی و مذهبی غنی دارد. سیاهدانه حاوی آلkaloidهایی مانند تیموکینون، کارواکرول، آنتول، ترپینول و لانگیفولن است که خواص ضد اکسیدانی و ضد التهابی قوی دارند و در پیش‌گیری از سرطان مؤثرند [۱۹].

براساس گزارش‌های موجود این دانه حاوی ۲۰-۲۷ درصد پروتئین خام، ۳۵-۳۸ درصد چربی خام، ۴/۵ درصد خاکستر و ۳۳-۳۸ درصد کربوهیدرات است [۱۵]. همچنین منبع غنی سدیم، کلسیم، پتاسیم، فسفر و آهن است [۲ و ۱۵]. سیاهدانه علاوه بر داشتن ترکیبات مؤثره دارویی، مقدار روغن و پروتئین بالا، ترکیب اسید آمینه و اسید چرب منحصر به‌فردی دارد، به‌طوری‌که پروتئین آن

تولیدات دامی

روزهای صفر، ۴۵ و ۹۰ آزمایش و پیش از خوراک‌دهی نوبت صبح برای اندازه‌گیری غلظت گلوکز، نیتروژن اورهای خون، تری‌گلیسیرید، کلسترول، آلبومین و پروتئین در خون انجام شد. نمونه‌های خون بلافارسله به آزمایشگاه منتقل و با ۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه برای جداسازی سرم سانتریفیوژ شدند. نمونه‌های سرم تا زمان اندازه‌گیری فرستنده‌های خون در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. برای اندازه‌گیری فرستنده‌های خون از کیت‌های تشخیص پارس آزمون و دستگاه الایزا (BIOTEK مدل ELX800، آلمان) استفاده شد.

در هفته پایانی دوره پروار و به مدت چهار روز، نمونه‌های جیره‌ها و مدفوع دام‌ها برای اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری به روش خاکستر نامحلول در اسید (AIA)، جمع‌آوری و تا زمان تعیین آزمایشگاهی ترکیبات آنها، در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. از خاکستر نمونه‌ها به عنوان مارکر داخلی برای اندازه‌گیری قابلیت هضم استفاده شد [۱۳]. در پایان دوره پروار، بردها پس از ۲۰ ساعت گرسنگی و تعیین وزن بدن ناشتا، کشتار شدند. سپس وزن لاشه، دنبه، چربی احشایی، چربی زیرپوستی، کبد، کلیه، طحال، قلب، بیضه، دستگاه گوارش پر و خالی اندازه‌گیری شدند.

پرس سرد بود. مقدار ماده خشک، چربی خام، خاکستر، ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی (ADIN) نمونه‌های کنجاله سیاه‌دانه با روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد [۵ و ۲۱]. برای بررسی تأثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سیاه‌دانه از تعداد ۱۸ راس بره نر نژاد زندی (با میانگین وزن ۲۹/۵±۱ کیلوگرم و میانگین سن ۱۳۵±۱۲ روز) در یک دوره تغذیه‌ای ۹۰ روزه در یک طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش بره در هر تیمار (تکرار) استفاده شد. دوره عادت‌پذیری بردها به شرایط آزمایشی ۱۴ روز بود. تیمارهای آزمایشی شامل ۱) جیره شاهد حاوی نه درصد کنجاله کلزا، ۲) جیره حاوی ۴/۵ درصد کنجاله کلزا و ۴/۵ درصد کنجاله سیاه‌دانه و ۳) جیره حاوی نه درصد کنجاله سیاه‌دانه بود (جدول ۱).

در طول دوره آزمایشی، بردها آزادانه به آب سالم دسترسی داشتند. خوراک‌دهی به صورت اختیاری در دو نوبت صبح (ساعت ۸:۳۰) و عصر (ساعت ۱۵:۳۰) انجام شد. اندازه‌گیری مصرف خوراک به صورت روزانه و وزن‌کشی به صورت هفتگی برای محاسبه افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک انجام شد. خون‌گیری در

جدول ۱. مواد خوراکی و ترکیب شیمیابی جیره‌های آزمایشی

سطح کنجاله سیاه‌دانه (درصد) ۹ ۴/۵ صفرا	ترکیب شیمیابی (محاسبه‌نشده)			خوراک (درصد ماده خشک) ۹ ۴/۵ صفرا			
	آنژی قابل متاپلیسم (مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک)	ماده خشک (درصد)	پروتئین خام (درصد)		چربی خام (درصد)	NDF (درصد)	خاکستر (درصد)
۲/۸۰	۲/۷۸	۲/۷۶	۹۰/۷	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۹۴/۹	۹۴/۷	۹۵/۷	۹۵/۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۴/۲	۱۴/۳	۱۴/۶		۴۵	۴۵	۴۵	
۳/۲	۲/۹	۲/۶		-	۴/۵	۹	
۳۸/۶	۳۹/۵	۴۰/۹۰		۹	۴/۵	-	
۷/۳	۷/۱	۷/۳		۵	۵	۵	
				۰/۵	۰/۵	۰/۵	
				۰/۲	۰/۲	۰/۲	
				۰/۳	۰/۳	۰/۳	
				مکمل معدنی- ویتامینی			

تولیدات دامی

دوره ۲۳ ■ شماره ۱ ■ بهار ۱۴۰۰

پروتئین خام و چربی خام جیره‌های آزمایشی در جدول (۲) ارائه شده است. تفاوتی در قابلیت هضم ماده آلی، NDF، چربی و پروتئین جیره‌های آزمایشی مشاهده نشد. مشابه با نتایج این مطالعه، جایگزینی سطوح مختلف کنجاله تخم آفتابگردان با کنجاله سیاهدانه در جیره برههای پرواری اثری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین و فیبر خام جیره‌های آزمایشی نداشته است [۷]. همچنین استفاده از سیاهدانه در جیره برههای برابرین، تأثیری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و NDF نداشت [۴]. با این حال گزارش شده است که با جایگزینی ۶۰ درصد کنجاله سویا با کنجاله سیاهدانه در جیره گوساله‌های دورگه فریزین- مصری، قابلیت هضم پروتئین خام افزایش می‌یابد ولی قابلیت هضم سایر مواد مغذی تغییری نمی‌کند [۱]. جیره‌های آزمایشی تأثیری بر میانگین وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی نداشت (جدول ۳). مشابه با نتایج این مطالعه، افزودن کنجاله سیاهدانه در مقایسه با کنجاله پنبه دانه در جیره برههای برکی تأثیر معنی‌داری بر وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی نداشت [۴].

داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار SAS (نسخه ۹/۱) با رویه Mixed Model (داده‌های تکرارشده در زمان) برای مدل (۱) تجزیه و میانگین‌ها با آزمون توکی در سطح ۰/۰۵ مقایسه شدند.

رابطه $Y_{ijk} = \mu + T_i + \delta_{ij} + t_k + (T \times t)_{ik} + e_{ijk}$ (۱) که در این رابطه Y_{ijk} ، مقدار هر مشاهده؛ μ ، میانگین کل؛ T_i ، اثر تیمار؛ δ_{ij} ، خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس ۰/۵؛ t_k ، اثر زمان نمونه‌گیری؛ $(T \times t)_{ik}$ ، اثر متقابل زمان در تیمار و e_{ijk} خطای آزمایشی است.

۳. نتایج و بحث

مقدار ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، NDF و ADIN کنجاله سیاهدانه به ترتیب $۱۲/۰ \pm ۳/۱$ ، $۳/۵ \pm ۱/۰$ ، $۷/۲۴ \pm ۰/۲۷$ ، $۹/۲ \pm ۰/۵۸$ و $۲/۱۵ \pm ۰/۱۷$ درصد بود. مقدار پروتئین خام به دست آمده در این مطالعه بالاتر و مقدار چربی خام آن مشابه نتایج آزمایش‌های دیگر بود [۲، ۱۵]. ترکیب شیمیایی کنجاله سیاهدانه نشان می‌دهد که به لحاظ پروتئین و چربی خام می‌تواند به عنوان خوراک با ارزش در جیره دام مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر گوارش‌پذیری ظاهری ماده آلی، NDF

جدول ۲. گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره‌های آزمایشی تعیین شده به روش خاکستر نامحلول در اسید

مقدار P	SEM	سطح کنجاله سیاهدانه			گوارش‌پذیری (درصد)
		۹	۴/۵	صفرا	
۰/۰۹	۱/۳۵	۶۷/۴	۷۰/۸	۶۶/۵	ماده آلی
۰/۱۰	۱/۹۵	۶۵/۶	۷۰/۸	۶۴/۱	پروتئین
۰/۲۷	۲/۳۴	۵۱/۸	۵۷/۴	۵۴/۵	فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF)
۰/۲۹	۲/۶۹	۷۱/۵	۷۶/۳	۷۰/۰	چربی

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

تولیدات دامی

دوره ۲۳ ■ شماره ۱ ■ بهار ۱۴۰۰

روغن و یا کنجاله سیاه‌دانه بر فرستجه‌های خونی گونه‌های حیوانی در آزمایش‌های مختلف، متفاوت گزارش شده است. مشابه با نتایج این مطالعه، جایگزینی پروتئین ذرت با پروتئین کنجاله سیاه‌دانه تأثیری بر سطح کلسترول خون نداشت ولی سطح پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین را افزایش داد [۴]. در مطالعات مختلف دیگر نیز استفاده از کنجاله سیاه‌دانه در جیره خرگوش سفید نیوزیلندی [۲۴]، سیاه‌دانه در جیره بردهای پرواری [۲۲] و همچنین روغن سیاه‌دانه در تغذیه گاوی‌میش [۱۶] سبب افزایش پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین خون شده است. احتمالاً افزایش آنابولیسم پروتئین در پی افزایش فعالیت تیروئید و همچنین افزایش قابلیت هضم پروتئین سبب افزایش غلظت پروتئین کل و آلبومین خون در این مطالعات شده است [۲۴].

مشابه نتایج این مطالعه، استفاده از سیاه‌دانه در جیره بزغاله‌های زرابی تأثیری بر غلظت نیتروژن اورهای و تری‌گلیسیرید سرم خون نداشت [۱۴]. اما در مطالعه‌ای استفاده از ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم سیاه‌دانه بهازای هر کیلوگرم وزن بدن در جیره بردهای پرواری، کلسترول و تری‌گلیسیرید خون را کاهش داد [۲۲]. همچنین خوراندن روزانه یک میلی‌گرم روغن سیاه‌دانه بهازای هر کیلوگرم وزن بدن موش‌های آزمایشگاهی و به مدت ۱۲ هفته سبب کاهش سطوح کلسترول، تری‌گلیسیرید و گلوکر سرم خون شد [۲۳].

در عین حال، در برخی گزارش‌ها افزودن سیاه‌دانه به جیره عملکرد رشد را بهبود داده است. به عنوان مثال افزودن ۱/۲ درصد سیاه‌دانه در جیره بردهای پرواری بربرین [۴] و ۰/۲ درصد در جیره بزغاله‌های زرابی [۱۴] سبب بهبود افزایش وزن روزانه آن‌ها شد. همچنین استفاده از سیاه‌دانه سبب افزایش مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و بهبود ضریب تبدیل در بردهای پرواری بربرین [۴] و بزغاله‌های زرابی [۱۴] شده است. افزایش مصرف خوراک وجود بهبود رشد با استفاده از سیاه‌دانه می‌تواند به دلیل وجود ترکیبات مؤثره درمانی [۴] و یا تحریک اشتهای حیوان باشد. احتمالاً طعم تند و تلخ سیاه‌دانه به دلیل وجود ترکیبات فنلی و روغن‌های ضروری سبب می‌شود که حیوان برای کاهش اثر آن، مقدار بیشتری خوراک مصرف کند [۱۲]. اگرچه این ترکیبات در کنجاله استفاده شده در این آزمایش اندازه‌گیری نشده است، اما با توجه به حلالیت آنها در چربی، احتمالاً غلظت و اثر آنها پس از روغن‌کشی کنجاله کاهش یافته است.

نتایج غلظت فرستجه‌های خون بردهای آزمایشی در جدول (۴) آمده است. به جز آلبومین و پروتئین کل خون که در بردهای تغذیه شده با نه درصد کنجاله سیاه‌دانه بیشتر از سایر تیمارها بود ($P < 0.05$)، سایر فرستجه‌های خونی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. تأثیر افزودن دانه،

جدول ۳. تأثیر جایگزینی کنجاله سیاه‌دانه به جای کنجاله کلزا بر عملکرد پروار بردهای آزمایشی

مقدار زمان تیمار	SEM	سطح کنجاله سیاه‌دانه			فرستجه
		۹	۴/۵	صفرا	
>۰/۰۱	۰/۳۹	۲۳/۷	۱۵۰۳/۷	۱۴۸۲/۶	میانگین خوراک مصرفی (گرم در روز)
-	۰/۷۲	۰/۹۹	۳۰/۴	۳۰/۵	وزن ابتدای دوره (کیلوگرم)
<۰/۰۱	۰/۸۵	۷/۸	۱۸۷/۷	۱۸۵/۶	میانگین افزایش وزن (گرم در روز)
-	۰/۹۳	۱/۰۶	۴۴/۸	۴۴/۲	وزن پایان دوره (کیلوگرم)
>۰/۰۱	۰/۶۰	۰/۴۶	۸/۰۶	۸/۱۲	ضریب تبدیل خوراک

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

تولیدات دامی

دوره ۲۳ ■ شماره ۱ ■ بهار ۱۴۰۰

جدول ۱. اثر جایگزینی کنجاله سیاهدانه به جای کنجاله کلزا بر غلظت فراسنجه‌های خون بردهای آزمایشی

مقدار P زمان	تیمار	SEM	سطح کنجاله سیاهدانه			فراسنجه
			۹	۴/۵	صفر	
<۰/۰۱	۰/۲۴	۴/۴۰	۸۰/۶	۷۷/۶	۶۹/۷	گلوکز (میلی گرم در دسی لیتر)
<۰/۰۱	۰/۲۹	۰/۸۷	۲۰/۵	۱۸/۵	۱۹/۱	نیتروژن اورهای خون (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۰۲	۰/۱۶	۰/۸۲	۴۱/۵	۴۰/۱	۳۹/۲	تری گالیسرید (میلی گرم در دسی لیتر)
<۰/۰۱	۰/۷۹	۲/۲۰	۵۹/۹	۶۰/۱	۵۷/۶	کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۱۲	<۰/۰۱	۰/۰۱	۳/۵۱ ^a	۳/۴۵ ^b	۳/۴۷ ^b	آلومین (گرم در دسی لیتر)
۰/۰۷	۰/۰۰۷	۰/۱۱	۵/۱۷ ^a	۴/۶۲ ^b	۴/۵۷ ^b	پروتئین کل (گرم در دسی لیتر)

. تفاوت اعداد با حروف ناشابه در هر ردیف معنی دار است ($P < 0.05$).

. SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

وزن کبد، قلب، طحال، کلیه و بیضه بردهای تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت. گزارشی در مورد تأثیر استفاده از سیاهدانه یا محصولات فرعی آن بر وزن اندام‌های بدن نشخوارکنندگان وجود ندارد. اما در برخی مطالعات، گزارش شده است که استفاده از منابع تولید اسیدلینولئیک مزدوج سبب افزایش وزن طحال و کبد در موش‌های آزمایشگاهی می‌شود [۹]، که در مطالعه حاضر چنین اثری مشاهده نشد. اگرچه در این مطالعه تفاوت معنی داری در وزن بیضه گوسفندان تیمارهای آزمایش مشاهده نشد، اما استفاده از روغن سیاهدانه در رژیم غذایی موش سبب افزایش وزن بیضه‌ها، اپیدیدیم و سینه‌نیال و زیکول و کاهش شمار اسپرم‌های غیرطبیعی شده است [۲۰]. همچنین در مطالعه دیگری استفاده روزانه از روغن سیاهدانه به میزان نیم میلی لیتر بازاری هر موش و به مدت دو ماه باعث افزایش وزن معنی دار سینه‌نیال و زیکول شده اما وزن بیضه‌ها و اپیدیدیم تغییری نکرده است [۸].

براساس نتایج این مطالعه و با توجه به کمبود منابع پروتئینی در تغذیه دام می‌توان کنجاله سیاهدانه را تا نه درصد جیره، جایگزین کنجاله کلزا در جیره بردهای پروواری کرد.

وزن و درصد لاشه بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت (جدول ۵). درصد دنبه، چربی زیرجلدی و کل چربی لاشه با مصرف کنجاله سیاهدانه کاهش یافت (P < 0.05). این نتایج با مطالعات قبلی در استفاده از سیاهدانه در جیره بردهای برابرین هم خوانی دارد [۴]. به نظر می‌رسد که میزان بالای اسید لینولئیک کنجاله سیاهدانه می‌تواند از طریق افزایش فراهمی اسیدلینولئیک مزدوج سبب تغییر در ساخت‌وساز لیپید در بدن شود. مشخص شده است که همبستگی منفی بین غلظت اسیدلینولئیک مزدوج خون و چربی لاشه وجود دارد. اسیدلینولئیک مزدوج در شرایط آزمایشگاهی از تکثیر سلول‌های پری‌آدیپوسایت‌های ۳T3-L1 جلوگیری و موجب آپوپتوز آنها می‌شود. همچنین به عنوان لیگاند رقبه‌ای برای PPAR γ در کترول پری‌آدیپوسایت‌ها عمل می‌کند. تمایز این سلول‌ها به چربی توسط فاکتورهای رونویسی مثل EBP- α و PPAR- γ تنظیم می‌شوند [۱۱]. همچنین مشخص شده است که اسیدلینولئیک مزدوج سبب کاهش لیپوژنر و افزایش لیپولیز در سلول‌های چربی از طریق کاهش فراوانی mRNA آنزیمه‌ای لیپوژنیک از جمله استیل CoA کربوکسیلاز و اسید چرب ستتاز (دو آنزیم کلیدی در سنتز چربی‌ها) می‌شود [۱۸].

تولیدات دامی

گوارش پذیری مواد مغذی، عملکرد، خصوصیات لاشه و فرستنده‌های خونی بره‌های زنده تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله سیاه‌دانه

جدول ۵. اثر جایگزینی کنجاله سیاه‌دانه به جای کنجاله کلزا بر صفات لاشه و وزن اندام‌های داخلی بره‌های آزمایشی

مقدار P	SEM	سطح کنجاله سیاه‌دانه			فرستنده
		۹	۴/۵	صفرا	
۰/۸۲	۰/۰۵	۲۲/۴	۲۲/۵	۲۲/۸	وزن لاشه گرم (کیلوگرم)
۰/۹۷	۱/۰۱	۴۹/۹	۵۰/۲	۵۰/۲	درصد لاشه (درصد وزن زنده)
<۰/۰۱	۰/۹۸	۱۴/۰ ^b	۱۱/۱ ^b	۱۹/۷ ^a	دنبه (درصد لاشه گرم)
۰/۰۵	۰/۳۹	۳/۱۷ ^b	۳/۷۴ ^{ab}	۴/۹۳ ^a	چربی زیر جلدی (درصد لاشه گرم)
۰/۴۵	۰/۶۳	۲/۹	۳/۱	۴/۰۳	چربی احتسابی (درصد لاشه گرم)
۰/۰۰۳	۱/۲۴	۲۰/۰ ^b	۱۷/۸ ^b	۲۸/۸۲ ^a	چربی کل (درصد لاشه گرم)
۰/۱۱	۰/۹۴	۱۱/۳	۷/۹	۹/۳	دستگاه گوارش خالی (درصد لاشه گرم)
۰/۲۱	۰/۰۹	۳/۲	۳/۰۲	۲/۹۸	کبد (درصد لاشه گرم)
۰/۱۹	۰/۰۱	۰/۷۶	۰/۸۰	۰/۷۹	قلب (درصد لاشه گرم)
۰/۲۱	۰/۰۱	۰/۲۴	۰/۳۰	۰/۲۷	طحال (درصد لاشه گرم)
۰/۵۰	۰/۰۲	۰/۵۰	۰/۵۱	۰/۵۵	کلیه (درصد لاشه گرم)
۰/۳۳	۰/۱۳	۱/۹۱	۱/۹۰	۱/۶۴	پیشه (درصد لاشه گرم)

.a-b: تفاوت اعداد با حروف نامشابه در هر ردیف معنی دار است (P<۰/۰۵).

.SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

4. پرورش پرندگان

- Poultry Science, 20: 757-776.
- Al-Gaby A (1998) Amino acid composition and biological effects of supplementing broad bean and corn proteins with *Nigella sativa* (black cumin) cake protein. Food Nahrung, 42(5): 290-294 .
- AOAC (1990) AOAC official methods of analysis: Association of Official Analytical Chemists Arlington, Virginia.
- Awadalla SA and Azza KM (2000) Effect of *Nigella sativa* seeds and oil on performance and some biochemical parameters in rabbit's serum. Egyptian Veterinary Nutrition Journal, 1: 31-42.
- Awadalla I (1997) The use of black cumin seeds (*Nigella sativa*) cake in rations of growing sheep. Egyptian Journal of Nutritional Feeds, 1: 243-249 .
- Bashandy AS (2007) Effect of fixed oil of *Nigella sativa* on male fertility in normal and hyperlipidemic rats. International Journal of Pharmacology, 3(1): 27-33 .
- Benjamin S and Spener F (2009) Conjugated linoleic acids as functional food: an insight into their health benefits. Nutrition & Metabolism, 6(1): 36-42.
- Carpenter KJ and Clegg KM (1956) The metabolizable energy of poultry feedstuffs in relation to their chemical composition. Journal of Science Food and Agriculture, 7: 45-51.

از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و کارشناس آزمایشگاه تغذیه دام پردیس ابوریحان به جهت حمایت و کمک در انجام این طرح، تشکر و قدردانی می‌گردد.

5. تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان وجود ندارد.

6. منابع مورد استفاده

- Abdel-Magid SS, El-Kady R, Gad SM and Awadalla I (2007) Using cheap and local non-conventional protein meal *Nigella sativa* as least cost rations formula on performance of crossbreed calves. International Journal of Agriculture Biology, 9(6): 877-880 .
- Abdo ZM (2004) Effect of phytase supplementation on the utilization of *Nigella Sativa* seed meal in broiler diets. Egyptian Poultry Science, 7: 143-162.
- AbouEl-Soud SB (2000) Studies on some biological and immunological aspects in Japanese quail fed diet containing some *Nigella sativa* seeds preparations. Egyptian

تولیدات دامی

11. Evans M, Geigerman C, Cook J, Curtis L, Kuebler B and McIntosh M (2000) Conjugated linoleic acid suppresses triglyceride accumulation and induces apoptosis in 3T3-L1 preadipocytes. *Lipids*, 35(8): 899-910.
12. Gilani A, Jabeen H, and Khan MA (2004) A review of medicinal uses and pharmacological activities of *Nigella sativa*. *Pakistan Journal of Biological Science*, 7(4): 441-445.
13. Goddard JS and McLean E (2001) Acid-insoluble ash as an inert reference material for digestibility studies in tilapia, *Oreochromis aureus*. *Aquaculture*, 194(1): 93-98.
14. Habeeb A and Tarabany A (2012) Effect of *Nigella sativa* or Curcumin on daily body weight gain, feed intake and some physiological functions in growing Zaraibi goats during hot summer season. Proceeding of The Third International on Radiation Sciences and Applications, Egypt.
15. Hosseini-Vashan SJ, Ghaznavi T (2018) Determination of nutritive value and metabolizable energy of *Nigella sativa* meal using leghorn cockerel and predicted AMEn models. *Iranian Journal of Animal Science Research*, 9 (4): 437-445.
16. Khattab H, Basiony A, Hamdy S and Marwan A (2011) Immune response and productive performance of dairy buffaloes and their offspring supplemented with black seed oil. *Iranian Journal of Applied Animal Science*, 1(4): 227-234.
17. Mousapour T, Salamoini M (2014) Effect of using different levels of *Nigella sativa* meal on the growth performance and meat quality of Japanese quails. *Iranian Journal of Animal Science Research*, 6 (1): 17-24.
18. Ostrowska E, Cross RF, Muralitharan M, Bauman DE and Dunshea FR (2002) Effects of dietary fat and conjugated linoleic acid on plasma metabolite concentrations and metabolic responses to homeostatic signals in pigs. *British Journal of Nutrition*, 88(6): 625-634 .
19. Takruri HR and Dameh MA (1998) Study of the nutritional value of black cumin seeds (*Nigella sativa L.*). *Journal of Science Food and Agriculture*, 76: 404-410.
20. Tawfeek F (2006) Effect of *Nigella sativa* oil treatment o the sex organs and sperm charactors in rat exposed to hydrogen peroxide. *Mesopotamia Journal of Agriculture*, 34(1): 2-8.
21. Van Soest P, Robertson J and Lewis B (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74(10): 3583-3597.
22. Zanouny A, Abd-el-Moty A, El-Barody M, Sallam M and Abd-el-Hakeam A (2013) Effect of supplementation with *Nigella sativa* seeds on some blood metabolites and reproductive performance of Ossimi male lambs. *Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences*, 8(1): 47-56 .
23. Zaoui A, Cherrah Y, Lacaille-Dubois M, Settaf A, Amarouch H and Hassar M (2000) Diuretic and hypotensive effects of *Nigella sativa* in the spontaneously hypertensive rat. *Therapie*, 55(3): 379-382 .
24. Zeweil H, Ahmed M, El-Adawy M and Zaki B (2008) Evaluation of substituting nigella seed meal as a source of protein for soybean meal in diets of New Zealand white rabbits. Paper presented at the 9th World Rabbit congress.